

| | | |
|----|------|---|
| ID | 患者氏名 | 様 |
|----|------|---|

(金曜入院)アブレーション治療(止血デバイス)を受けられる方へ 【患者用クリニカルパス(入院スケジュール)】

この計画書は診療の概要を記したものであり、状況に応じて変更することがあります。 ※何かご不明な点があったら、担当医又は看護師にお尋ねください。

| 経過 | 年 月 日 | 月 日 ~ 月 日 | 月 日 | | 月 日 | 月 日 |
|----------|---|---|---|--|---|--|
| | 入院日 | 入院2日目～治療前日 | 治療当日 | | 治療後1日目 | 治療後2日目(治療後2日目に退院) |
| | | | 治療前 | 治療後 | | |
| 達成目標 | <ul style="list-style-type: none"> 身体に問題がなく採血等の検査が終了している 検査の必要性について理解できる | <ul style="list-style-type: none"> 身体に問題がない 治療前日の処置について理解できる 治療の必要性について理解できる | <ul style="list-style-type: none"> 発熱なく治療を受けることができる | <ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない 針を刺した所に異常がない 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない 指先の動きがスムーズである | <ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない 針を刺した所に異常がない 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない 指先の動きがスムーズである | <ul style="list-style-type: none"> 血圧が安定している 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない 針を刺した所に異常がない 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない 指先の動きがスムーズである |
| 検査治療処置 | <ul style="list-style-type: none"> 体温、血圧、脈拍を測ります 採血、心電図、胸部レントゲンなどの検査をします 医師の診察があります 心電図モニターを装着します  | <ul style="list-style-type: none"> 体温、血圧、脈拍を測ります | <ul style="list-style-type: none"> 検査着に着替えます 入れ歯、指輪、時計等は、はずします | <ul style="list-style-type: none"> 医師の指示に沿って圧迫止血の圧迫を緩めていき、最終的には除去します 必要時、採血、レントゲン検査、心電図検査があります  | <ul style="list-style-type: none"> 採血、レントゲン検査、心電図検査があります 医師の診察があります  | <ul style="list-style-type: none"> 必要時、採血、レントゲン検査、心電図検査があります |
| 内服薬注射 | <ul style="list-style-type: none"> 薬剤師・看護師が持参されたお薬を確認します 内服薬は継続服用です  | <ul style="list-style-type: none"> 内服薬は継続服用です  | <ul style="list-style-type: none"> 指示した内服薬のみを服用してください 持続点滴を開始します  | <ul style="list-style-type: none"> 内服薬の服用を再開します 術後新たに内服が開始となります 指示された点滴量が終了したら点滴を抜去します  | | |
| 活動安静度 | <ul style="list-style-type: none"> 安静度に制限はありません  | | <ul style="list-style-type: none"> ストレッチャーで検査室に行きます | <ul style="list-style-type: none"> 医師の指示あるまでベッド上安静となります  | <ul style="list-style-type: none"> 病棟内歩行可となります 安静度に制限はありません  | |
| 食事 | <ul style="list-style-type: none"> 治療食を食べます  | | <ul style="list-style-type: none"> 指示した時間以降の食事、飲水は禁止です  | <ul style="list-style-type: none"> 治療後より飲水可能です 治療後、3時間後から食事再開となります  | <ul style="list-style-type: none"> 治療食を食べます  | |
| 清潔 | <ul style="list-style-type: none"> シャワー浴ができます  | | <ul style="list-style-type: none"> 治療まではシャワー浴ができます | | <ul style="list-style-type: none"> 適宜、体を拭くお手伝いをします | <ul style="list-style-type: none"> 医師の診察後、シャワー浴ができます  |
| 排泄 | <ul style="list-style-type: none"> トイレ歩行ができます  | | <ul style="list-style-type: none"> 治療まではトイレ歩行ができます 尿の管をいれます  | <ul style="list-style-type: none"> 治療後、ベッド上安静が解除されるまでは尿の管を使用します  | <ul style="list-style-type: none"> トイレ歩行ができます  | |
| 指導説明書類 | <ul style="list-style-type: none"> ネームバンドを装着します 入院時オリエンテーションがあります 医師から治療の説明があります 心臓電気生理検査・カテーテルアブレーション説明・同意書 治療前オリエンテーション 入院診療計画書  | <ul style="list-style-type: none"> 治療オリエンテーションと治療前、治療後の準備説明があります | | <ul style="list-style-type: none"> 治療後、医師から説明があります  | <ul style="list-style-type: none"> 退院についての説明があります 【退院基準】 血圧が安定している 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等がない 針を刺した所に異常がない 指先の色が悪かったり、冷たかったりしない 指先の動きがスムーズである 【退院後の治療計画】 内服薬の継続 定期的な外来受診 | <ul style="list-style-type: none"> 【退院後の生活について】 息切れ、動悸、胸の重たい感じ、胸の痛み等の症状があるときは外来受診をしましょう 針を刺した所に痛みがあったり、指先の色が悪かったり、冷たかったり、指先の動きが悪い時は外来受診をしましょう 【連絡先】 徳島大学病院:088-631-3111 代表番号になっていますので、退院後は下記へお知らせください 内科外来:088-633-7118 時間外受付(救急外来):088-633-9211 |
| リハビリ・その他 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 治療後、病棟に戻ります | <ul style="list-style-type: none"> 【指導】 服薬指導 退院後の生活について指導 | |