

徳島大学病院泌尿器科科長



金山 博臣

答
え

65歳の男性です。前立腺がんと診断され、手術が放射線治療を勧められました。どちらが良いのか分かりません。他にも治療法はありますか。年齢は7・5歳／日で、がんは前立腺の中などといひつけられました。無理にでも言わせてください。



質問

日本人の死因トップがのがん。一方、医療の進歩により、早期発見・早期治療で治る可能性も高まっている。徳島県が昨年発足させた「徳島がん対策センター」の協力で、最新のがん治療や在宅治療について、読者の質問に答えます。

65歳の男性です。前立腺がんと診断され、手術が放射線治療を勧められました。どちらが良いのか分かりません。他にも治療法はありますか。年齢は7・5歳／日で、がんは前立腺の中などといひつけられました。無理にでも言わせてください。

がん対策センターの協力で、最新のがん治療や在宅治療について、読者の質問に答えます。

内分沁治療法は、前立腺がんが悪性で、手術が放射線治療を勧められる場合の治療法で、腫瘍を缩小する方法（ホルモン療法）があります。

男性ホルモンに依存する腫瘍を

利用した治療で、男性ホルモンを少なくする方法（雄性ホルモン

を多くする方法（雌性ホルモン

治療法）があります。

内分沁治療法は、前立腺がんが悪性で、手術が放射線治療を勧められる場合の治療法で、腫瘍を缩小する方法（ホルモン療法）があります。

男性ホルモンに依存する腫瘍を

利用した治療で、男性ホルモンを

少なくする方法（雄性ホルモン

治療法）があります。

内分沁治療法は、前立腺がんが悪性で、手術が放射線治療を勧められる場合の治療法で、腫瘍を缩小する方法（ホルモン療法）があります。

男性ホルモンに依存する腫瘍を

利用した治療で、男性ホルモンを

少なくする方法（雄性ホルモン

治療法）があります。

あさかわ。

内分沁治療法は、前立腺がんが悪性で、手術が放射線治療を勧められる場合の治療法で、腫瘍を缩小する方法（ホルモン療法）があります。

男性ホルモンに依存する腫瘍を

利用した治療で、男性ホルモンを

少なくする方法（雄性ホルモン

治療法）があります。

内分沁治療法は、前立腺がんが悪性で、手術が放射線治療を勧められる場合の治療法で、腫瘍を缩小する方法（ホルモン療法）があります。

男性ホルモンに依存する腫瘍を

利用した治療で、男性ホルモンを

少なくする方法（雄性ホルモン

治療法）があります。

内分沁治療法は、前立腺がんが悪性で、手術が放射線治療を勧められる場合の治療法で、腫瘍を缩小する方法（ホルモン療法）があります。

男性ホルモンに依存する腫瘍を

利用した治療で、男性ホルモンを

少なくする方法（雄性ホルモン

治療法）があります。

手術・放射線は根治期待

前立腺がんの治療法は

前立腺がんの治療法は、がんの広がり、悪性度、患者の年齢や体の状態を参考に決定します。

POA直腸摘出（前立腺の腫瘍マーカー）などでがんが変わると、前立腺の10~12方に針を刺して組織を探取し、顯微鏡で調べます。がんが発見され



ます。手術、放射線治療、内分沁（ホルモン）療法です。

手術は、下腹部を開き切開す

る開腹手術と、小さな穴をつ

いたり、手術用器具を挿入する

6カ所開いた腹腔鏡手術があり

ます。10日前の週間程度の入

院が必要で、食事には、出血

や尿失禁などあります。腹腔

鏡手術は腫が小さい出張が少

です。

放射線治療は、小線源療法（組織内照射）と、外照射法

があります。小線源療法は、

小さな金属製の線源を数十個

入れたHUTS線源袋。

上部の四分之一部分は抜き

い、「ド」チタン製密封小線源カーペル

は、手術用器具の代わりに、

射出装置で、腫瘍を直接攻撃す

ります。がんが前立腺の外へ広

がっていても転移がない場合

は、ホルモン療法（放射線外照射

治療法）の併用を試することが

多く、骨転移など、がんが身

になつていても転移がない場合

で治療します。

質問者は、若くて骨転移な

く、早期がんで低リスクですか

りです。

小線源療法（永久留置法）

は、前立腺が腫れて尿が止ま

くなる場合があるので、前立腺

が大きくて排尿障害があるな

ら、手術、放射線治療が、こ

じよ。前立腺があまり大きくな

く、でもまだ大きめで治療の

期間を短くした場合は小線源

療法で良いと思われます。入院し

たくない場合は外照射療法が

ります。