

十一曜日

三德

卷之三

秉斤

月見

第3種郵便物認可

健 康

岡田 泰行



德島大学病院

回答
本では増加して
脾臓がんは


いるからです。脾臓かんになると腹痛や背部痛の症状のほかに、黄疸や体重減少、食欲不振が出てきます。しかし、これらの症状は脾臓がん以外の病気でもみられます。必ずしも早期発見につながるわけではありません。

早期がんは無症状のことが多く、残念ながら症状が出た時には多くの患者で既にがんが進行している状態で発見されま

早期がんは無症状のことが多く、残念ながら症状が出た時には多くの患者で既にがんが進行している状態で発見されま

脳腫がんの原因はまだはつきり分かつていません。しかし、いくつかのリスク要因が分かつてきました。例えば、脳腫がん患者が家族にいると、リスクが高いとされています。さらに、第1近親者（親や兄弟、子）にうる家系は痔リスクが

超音波内視鏡が高確率



がん何でもクイズ

- ①5人②3人③2人

行こうよ！がん検診

るなど自分にできる」とから実践するのが大切です。もし臓がんと診断された場合でも、外科治療や抗がん剤治療が進歩しています。諦めずに医療スタッフに相談してください。共に克服を目指しましよう。

がん
何でも
Q&A

てのがんで早期発見が痛いと言っていた知人が、病院で脾臓がんと診断された。脾臓がんは発見が遅れると聞きましたが、早期に発見すれば治る可能性があるのです。

高いとの報告があり、こうした家系は家族性脾臓がんの可能性が高いです。

脾臓がんを見つけるには、脾臓がんを検査を受ける必要があります。外来では、らよく腫瘍マーカーEAやCA19-9を調べてほしいと相談

ことがあります。それでも、肺腺がんを含め早期がんで上昇している傾向は少ないです。

がんに関する質問は
徳島がん対策センター
電話 088(634)6442
(平日午前
8時半から
午後5時ま
で) ^。